

内頸動脈狭窄症の外科的治療成績

CEA ; Carotid endarterectomy

術後30日以内の周術期合併症は以下のとおりです

■対象期間：2002.6～2019.12

■対象症例：957例（男性817例/女性140例）
平均年齢73.1歳

□永続的合併症 8例(0.8%)

| 施行年 | 症状 | 年代 | 性別 |
|------|----------|-----|----|
| 2004 | 嚥下障害 | 60代 | 男性 |
| 2007 | 不全片麻痺 | 70代 | 男性 |
| 2008 | 視野障害※1 | 60代 | 男性 |
| 2009 | 構音障害 | 70代 | 男性 |
| 2010 | 嚥下障害 | 80代 | 男性 |
| 2012 | 不全片麻痺 | 70代 | 女性 |
| 2014 | 術後脳梗塞 | 60代 | 男性 |
| 2016 | 意識障害・右麻痺 | 80代 | 男性 |

※1 反対側内頸動脈高度狭窄が原因の脳梗塞を術中併発

□死亡 2例(0.2%)

| 施行年 | 症状 | 年代 | 性別 |
|------|-------|-----|----|
| 2007 | 右完全麻痺 | 90代 | 男性 |
| 2011 | 術後心不全 | 80代 | 男性 |

内頸動脈狭窄症の外科的治療成績

CEA ; Carotid endarterectomy

□一過性合併症 16例(1.7%)

| 施行年 | 症状 | 年代 | 性別 |
|------|-------------------------|-----|----|
| 2003 | 嚥下障害 | 60代 | 男性 |
| 2004 | 構音障害 | 60代 | 男性 |
| 2009 | 術後出血(創部) ^{※2} | 70代 | 男性 |
| 2010 | 術後出血(穿刺部) ^{※2} | 60代 | 男性 |
| 2011 | 術後出血(創部) ^{※2} | 60代 | 男性 |
| 2011 | 術後心筋梗塞 ^{※3} | 70代 | 男性 |
| 2010 | 術中解離 ^{※4} | 60代 | 男性 |
| 2013 | 不全片麻痺 | 70代 | 男性 |
| 2014 | 舌下神経麻痺 | 70代 | 男性 |
| 2015 | 舌下神経麻痺 | 70代 | 男性 |
| 2015 | 舌下神経麻痺 | 60代 | 男性 |
| 2015 | 不全片麻痺 | 70代 | 男性 |
| 2015 | 嘔声 | 80代 | 女性 |
| 2017 | 嘔声 | 70代 | 男性 |
| 2019 | 嘔声 | 70代 | 男性 |
| 2019 | 嘔声 | 70代 | 男性 |

※2 止血術施行 ※3冠動脈ステント留置術施行 ※4 CAS施行 いずれも症状なし

□術後再狭窄に対する再治療 26例(2.7%)

■再治療までの平均期間：582日(42日～4672日)

■再治療内容：25例/CAS(頸動脈ステント留置術)
1例/バイパス術